

očná roztoková instilácia bez konzervačných látok

1. Čo je OCUhyal C a na čo sa používa

OCUhyal C je očná roztoková instilácia bez konzervačných látok s obsahom hyaluronátu sodného a s prídavkom extraktu nechtíka lekárskeho. Má zvlhčujúci, upokojujúci a lubrikačný účinok. Vďaka obsahu kyseliny hyalurónovej (prírodzene sa vyskytujúcej látky v oku a iných častiach tela) poskytuje OCUhyal C efektívnu úľavu a dlhotrvajúci komfort pri pocite suchého oka, pálenia a únave očí. Extrakt nechtíka lekárskeho má ochranný, protizápalový a regeneračný účinok na epitel oka.

OCUhyal C sa používa pri zníženej tvorbe slz, k zvlhčeniu, ochrane a lubrikácii povrchu oka a pri stavoch spojených s príznakmi suchého oka:

- suchá keratokonjunktivitída (nedostatok slz, pálenie, rezanie, svetloplachosť, pocit cudzieho telieska v oku)
- poranenie rohovky, erózia rohovky, po operácii rohovky
- hormonálne zmeny (menopauza)
- dlhá práca pri počítači, dlhé jazdy autom, lety na dlhú vzdialenosť
- klimatizácia, vietor, chlad, suché teplo, prach, dym, znečistené ovzdušie

OCUhyal C neobsahuje konzervačné látky, preto je ideálnym prípravkom pre nositeľov kontaktných šošoviek a pre osoby s citlivými očami.

OCUhyal C môžu používať dospelí, mladiství a deti.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete OCUhyal C

Nepoužívajte OCUhyal C, ak ste alergický na ktorúkoľvek zložku tohto prípravku. Ak v súčasnosti používate aj iné očné prípravky, vo všeobecnosti sa odporúča dodržať aspoň 5 minútový interval medzi aplikáciou jednotlivých prípravkov.

3. Ako používať OCUhyal C

Zvyčajne sa aplikuje 1 kvapka 1 až 3 krát denne, môže sa aplikovať aj častejšie.


OCUhyal C je možné používať dlhodobo.

Nositelia kontaktných šošoviek


OCUhyal C sa môže používať pri súčasnom nosení kontaktných šošoviek.

Upozornenie pred aplikáciou

1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.
2. Odskrutkujte uzáver so závitom.



3. Pridržiavajte fľaštičku smerom nadol, medzi palcom a ostatnými prstami.
4. Pred prvou aplikáciou sa odporúča jemným stlačením fľaštičky skúšobne odkvapnúť prvú kvapku mimo oka, pretože pri silnom a nerovnomernom stláčaní môže roztok vystreknúť vo väčšom objeme.
5. Ukazovák jemne potiahnite spodné viečko postihnutého oka.




6. Priblížte koniec kvapkadla blízko k vášmu oku tak, aby sa nedotkol oka alebo jeho okolitých oblastí.


7. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do vášho oka dostala jedna kvapka. Potom uvoľnite spodné viečko a pomaly zatvorte oko, aby sa **OCU^{hyal}C** rovnomerne rozmiestnil po očnom povrchu.

Pre ďalšiu kvapku treba nechať späťne nasať vzduch do plastovej fľaštičky, aby sa vrátila do pôvodného stavu a potom pokračovať v aplikácii do oka odporúčaným spôsobom.

Upozorňujeme, že po stlačení môže trvať niekoľko sekúnd, kým dôjde k uvoľneniu kvapky. Nestláčajte príliš silno.



8. V prípade potreby, postup opakujte aj pre druhé oko.



9. Po použití otraste fľaštičku bez dotyku kvapkadla smerom nadol, aby sa odstránila zostávajúca kvapka. Je to potrebné na zabezpečenie sterility nasledujúcich kvapiek.

10. Bezprostredne po použití nasadte pevne uzáver späť na fľaštičku.

4. Aké sú možné vedľajšie účinky

Zriedkavo sa bezprostredne po aplikácii môže vyskytnúť prechodné mierne pálenie alebo alergická reakcia na niektorú zo zložiek prípravku. V prípade výskytu týchto nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných nezvyčajných reakcií sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnik.

5. Čo **OCU^{hyal}C** obsahuje

Hyaluronát sodný 1,2 mg/ml, extrakt nechtíka lekárskeho, chlorid sodný, octan sodný, citrát sodný, chlorid draselný, chlorid vápenatý, chlorid horečnatý, čistená voda.

6. Ako uchovávať **OCU^{hyal}C** a ďalšie informácie

Fľaštičku uchováajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C.

Chráňte pred chladom a mrazom.

Prípravok uchováajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte po dátume expirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo na škatuľke pri ikone presýpacích hodín. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

OCU^{hyal}C nepoužívajte dlhšie ako tri mesiace po prvom otvorení fľaštičky.

Veľkosť balenia: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Dátum poslednej revízie: Apríl 2020